



NACHRICHTEN
DER ARBEITSGEMEINSCHAFT RHEINISCH-WESTFÄLISCHER LEPIDOPTEROLOGEN

XXIX. Jahrgang, Heft 4



Leverkusen, 1. Dezember 2017

.....
Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.
Verein für Schmetterlingskunde und Naturschutz mit Sitz am Aquazoo-LÖBBECKE Museum
Düsseldorf

Schriftleitung: GÜNTER SWOBODA, Am Weingarten 21, D-51371 Leverkusen
.....

ISSN 0941-3170

Inhalt

ROSENBAUER, A. & HEMMERSBACH, A.: Die Hochmoor-Bodeneule <i>Coenophila subrosea</i> (STEPHENS, 1829) in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Gebieten Niedersachsens: Aktuelle Vorkommen und Habitatansprüche (Lep., Noctuidae)	137
BLUM, E.: Zum Erstnachweis von <i>Idaea sericeata</i> (HÜBNER, 1813) in Deutschland (Lep., Geometridae)	152
WEGNER, H.: <i>Sideridis turbida</i> (ESPER, 1790) (= <i>albicolon</i> (HÜBNER, 1813)), die Sandflur-Kräutereule, in Nordost-Niedersachsen und in Schleswig-Holstein (Lep., Noctuidae)	154
BÜCKER, J.: Erstnachweis von <i>Synanthedon flaviventris</i> (STAUDINGER, 1883) für Nordrhein-Westfalen mit Hilfe von Pheromonfallen (Lep., Sesiidae)	167
GÖTLINGER, W.: Kleine Mitteilungen. „Neue Pflanze, neuer Falter“: Erstnachweis der Palpenmotte <i>Chrysoesthia drurella</i> (FABRICIUS, 1775) für den Rhein-Erft-Kreis (Nordrhein- Westfalen/Niederrheinische Bucht) (Lep., Gelechiidae)	173
DAHL, A. & GOERIGK, M.: <i>Idaea rusticata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775): Arealerweiterer in Nordrhein-Westfalen (Lep., Geometridae)	175
WITTLAND, W.: Zur Bestimmung dreier Arten der Gattung <i>Sciota</i> HULST, 1888: <i>Sciota rhenella</i> (ZINCKEN, 1818), <i>Sciota hostilis</i> (STEPHENS, 1834) und <i>Sciota adelphella</i> (FISCHER v. RÖSLERSTAMM, 1836) (Lep., Pyralidae, Phycitinae)	180

Redaktionelles

Korrektur zu: SELIGER, R. & HEMMERSBACH, A.: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) und weitere Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) im Naturschutzgebiet „Brachter Wald“ (Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen) in Melanargia, 29. Jahrgang (2017), Heft 3, Seite 93-105	188
--	-----

I

Titelbild: Weiblicher Falter von *Coenophila subrosea* (STEPHENS, 1829): Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Recker Moor, 23.08.2017 (Foto: F. ROSENBAUER)